

## こんな事故が起きています

### 液体芳香剤の誤飲など



家庭でも広く利用されている「リードディフューザー」(ボトルに入った液体芳香剤の液に木製の棒などを浸し、吸い上げられた液を拡散させる)などの液体芳香剤で、乳幼児の事故が発生しています。

#### ●誤飲

1歳の子どもが、トイレに置いてあったリードディフューザーを飲んでしまった。  
嘔吐、発熱、激しいせき込み、頻呼吸で化学性肺炎と診断され、2週間入院した。

#### ●接触

棚の上にあったアロマディフューザーが倒れ、0歳の子どもが液を頭から浴びてしまい、顔面が腫れてしまった。

## アドバイス

◇**乳幼児の手の届かない場所で使用・保管**しましょう。  
液体芳香剤の液を誤飲した場合、吐き気や嘔吐、意識障害やけいれんを起こすおそれがあります。

◇液が気管に入ると、  
化学性肺炎をおこす危険があります。

#### 誤飲した場合

慌てて吐かせず  
商品名と飲んだと思われる量を確認  
直ちに医療機関に相談

◇液が目に入った場合

こすらず、すぐに流水で流す

◇液が皮膚に付着した場合

かぶれるおそれがあるため  
付着した可能性のある衣服をぬぐ  
せっけんなどでよく洗う  
症状が残るときは医療機関を受診